




# لقاح كوفيد-19 الحقائق



العربية / Arabic



## هل لقاحات كوفيد-19 آمنة رغماً عن تطويرها بهذه السرعة؟

لقد تمّ تطوير لقاحات كوفيد-19 دون المساس بالجودة والسلامة والفعالية.

قد يبدو ظاهرياً أنه تمّ تطوير هذه اللقاحات بسرعة كبيرة، لكن الباحثين في جميع أنحاء العالم ظلوا يعملون بجد لتطوير لقاحات كوفيد-19 من المراحل الأولى للوباء.

لقد تمكنا من تسريع تطوير اللقاحات بفضل التعاون بين فرق البحث والعلماء والمصنعين والموزعين.

تمّ تنفيذ مراحل تخطيط التطوير والتنفيذ متزامنة بدلاً عن واحدة تلو الأخرى، حيث أصبح هذا ممكناً بسبب التمويل العالمي غير المسبوق. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ البحث في كيفية الاستجابة للأوبئة قبل فترة طويلة من جائحة كوفيد-19.

يبحث هذا البحث في بيانات من فيروسات كورونا السابقة مثل فيروس SARS في عام 2002 وفيروس MERS في عام 2012، مما يمنح الباحثين السابق عندما يتعلق الأمر بتطوير لقاحات كوفيد-19.

في أستراليا، تقوم إدارة السلع العلاجية (TGA) بإجراء تقييم دقيق للقاحات المحتملة لكوفيد-19 من أجل السلامة والجودة والفعالية. وستستمر في القيام بذلك مع جميع اللقاحات قبل الموافقة عليها وإتاحتها للأستراليين.

بمجرد الموافقة على اللقاح، يجب أيضاً فحص كل دفعة للتأكد من أنها تفي بنفس معايير الجودة.



## تتم مراقبة سلامة اللقاح بشكل مستمر

ستقوم TGA باستمرار بمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 أثناء طرحها في أستراليا وعلى الصعيد الدولي.

يساهم أخصائيو الرعاية الصحية في المراقبة المستمرة من خلال إبلاغ TGA بأية آثار جانبية، حتى لو كانت طفيفة جداً.

هذا يعني أن TGA يمكن أن تشرف على سلامة اللقاح في جميع أنحاء الدولة. وفي حالة حدوث خطر على السلامة غير مرجح، قم بإبلاغ مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع والحكومة في أقرب وقت ممكن.

يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول سلامة اللقاح على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الأسترالية:

[www.health.gov.au/node/18289](http://www.health.gov.au/node/18289)



## تحدّث إلى طبيبك إذا كانت لديك أية أسئلة حول تلقي لقاح كوفيد-19

أفضل شخص يمكنك التحدث إليه إذا كانت لديك أسئلة حول صحتك والحصول على لقاح كوفيد-19 هو طبيبك/الطبيب العمومي.

إذا حدثت لك في السابق ردة فعل تحسسية تجاه اللقاح، فمن المهم أن تتحدث إلى طبيبك قبل تلقي لقاح كوفيد-19.


إذا كان لديك تاريخ من حالات تخثر الدم، تجلط الجيوب الوريدية الدماغية أو نقص الصفائح الناجم عن الهيبارين، يُستحسن التحدث إلى طبيبك قبل تلقي لقاح كوفيد-19. الأشخاص الذين لديهم تاريخ طبي لهاتين الحالتين النادرين يُنصحون بالانتظار قبل تلقي لقاح كوفيد-19 كإجراء وقائي.

قد تتغير هذه النصيحة مع توفر المزيد من الأدلة.

# لقاح كوفيد-19: الحقائق

الحصول على لقاح كوفيد-19:

يقلل من خطر  
إصابتك بكوفيد-19



بحميك من شدة  
أمرض إذا أصبت  
بكوفيد-19



يساعد على حماية  
أصدقائك وعائلتك  
ومجتمعك



إذا تمّ تطعيم معظم الناس، فلن ينتشر الفيروس بسهولة. هذا يوفر حماية أيضاً للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على اللقاح.

## معلومات عن لقاحات كوفيد-19

يُنصح الأشخاص المؤهلون لتلقي لقاح كوفيد-19 بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن. ومع التطورات الجديدة في لقاح كوفيد-19 كل يوم، فمن الطبيعي أن تكون لديك أسئلة حول سلامة اللقاح وتوافره.

اللقاحان اللذان تمت الموافقة عليهما من قبل إدارة السلع العلاجية يتطلبان جرعتين. كلاهما مجانيان للأشخاص المؤهلين في أستراليا.

معلومات عن لقاح Pfizer (Comirnaty) ضد كوفيد-19

[www.health.gov.au/resources/publication/information-on-pfizer-vaccine-arabic](http://www.health.gov.au/resources/publication/information-on-pfizer-vaccine-arabic)

معلومات عن لقاح AstraZeneca ضد كوفيد-19

[www.health.gov.au/resources/publication/information-on-covid-19-astrazeneca-vaccine-arabic](http://www.health.gov.au/resources/publication/information-on-covid-19-astrazeneca-vaccine-arabic)

أنا حاصلة  
على اللقاح





## الآثار الجانبية للقاح كوفيد-19

شأنها شأن العديد من اللقاحات الأخرى، يمكن أن تكون للقاحات كوفيد-19 آثارٌ جانبية. هذه الأعراض بشكل عام خفيفة وتزول خلال يوم أو يومين في المتوسط. وإذا كانت لديك أية أسئلة حول اللقاح، اسأل طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلاني.

تشمل ردود الفعل الشائعة للقاحات ما يلي:

- ألم في مكان الحقن
- آلام في العضلات • صداع
- تعب • حمى

الآثار الجانبية الخطيرة مثل ردات الفعل أو الحساسية المفرطة نادرة للغاية. وفي حالة حدوث ذلك، تتوفر لدى مقدمي اللقاح أدوية لعلاج ردة الفعل بشكل فعال وفوري.

يبدو أن لقاح AstraZeneca ضد كوفيد-19 مرتبط بأثر جانبي نادر يسمى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات (TTS) والتي تنطوي على جلطات دموية (تجلط) وانخفاض في مستويات الصفائح الدموية (نقص الصفيحات الدموية)، ويحدث بعد حوالي 4-20 يوم من تلقي اللقاح. اتصل بطبيبك/الطبيب العمومي للحصول على المزيد من المعلومات.

## للمزيد من المعلومات

### مواقع إلكترونية:

- لقاحات كوفيد-19 التابعة لوزارة الصحة الأسترالية:  
[www.health.gov.au/node/18289](http://www.health.gov.au/node/18289)
- معلومات حول لقاح كوفيد-19 من حكومة فكتوريا:  
[www.coronavirus.vic.gov.au/arabic](http://www.coronavirus.vic.gov.au/arabic)

### التواصل بالهاتف:

- خط المساعدة الوطني الخاص بفيروس كورونا. للحصول على معلومات حول كوفيد-19، اتصل بخط المساعدة الوطني لفيروس كورونا التابع للحكومة الأسترالية على الرقم **1800 020 080**.
- مشورة صحية على مدار 24 ساعة **1800 022 222**.
- الخط الساخن الخاص بفيروس كورونا بفكتوريا **1800 675 398** (24 ساعة يومياً).
- للاستعانة بمتجم، اتصل بالخط الساخن الخاص بفيروس كورونا على الرقم **1800 675 398** ثم اضغط على الرقم 0.
- إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، تحدّث إلى طبيبك العمومي.

### المصادر:

- [www.coronavirus.vic.gov.au/getting-vaccinated](http://www.coronavirus.vic.gov.au/getting-vaccinated)
- [www.health.gov.au](http://www.health.gov.au)
- [www.healthdirect.gov.au/covid-19-vaccine-side-effect-checker](http://www.healthdirect.gov.au/covid-19-vaccine-side-effect-checker)

## مركز موناش المدني

293 Springvale Road, Glen Waverley 9518 3555 [www.monash.vic.gov.au](http://www.monash.vic.gov.au)

### Language Assist:



普通话	9321 5485	Ελληνικά	9321 5482	廣東話	9321 5481	සිංහල	7005 3002	Italiano	9321 5483
हिंदी	7005 3000	Việt Ngữ	9321 5487	தமிழ்	7005 3003	한국어	9321 5484	Bahasa Indonesia	7005 3001