



COVID-19 백신

관련 정보 안내



COVID-19 백신에 관한 사실

COVID-19 백신 접종:

COVID-19에 감염될
위험을 줄여줍니다



COVID-19에
감염되더라도 심하게
아프지 않도록 보호합니다



친구와 가족 및
지역사회를 보호하도록
지원합니다



대부분의 사람들이 백신을 접종하게 되면 바이러스가 쉽게 확산되지 않습니다.
이를 통해 백신 접종이 불가능한 사람들도 보호할 수 있습니다.

COVID-19 백신 안내

COVID-19 백신 접종 대상자는 최대한 빨리 접종을 마치시기 바랍니다.
COVID-19 백신과 관련해 새로운 사건이 매일 발생하고 있는 상황에서
백신의 안전성과 접종 여부에 대해 의구심을 가지는 것은 당연합니다.

호주 식품의약청(Therapeutic Goods Administration)이
승인한 두 가지 백신은 2회에 걸쳐 접종해야 합니다. 호주 내 접종
대상자는 2회 모두 무료로 접종 받을 수 있습니다.

- COVID-19 화이자(Comirnaty) 백신 정보
www.health.gov.au/resources/publication/information-on-pfizer-vaccine-korean
- COVID-19 아스트라제네카 백신 정보
www.health.gov.au/resources/publication/information-on-covid-19-astrazeneca-vaccine-korean





COVID-19 백신이 안전성을 보장하기에 너무 빨리 개발된 것이 아닌가요?

COVID-19 백신은 품질과 안전성 및 효능이 저해되지 않도록 개발되었습니다.

COVID-19 백신들이 너무 신속하게 개발된 것처럼 보일 수 있으나, 전 세계의 연구자들은 팬데믹 초기부터 백신 개발에 매진해 왔습니다.

연구팀, 과학자, 제조사 및 유통사들의 협력 덕분에 백신의 신속한 개발이 가능했습니다.

백신 개발과 실행 계획 단계가 순차적이 아닌 동시에 진행되었습니다. 이러한 전례 없는 과정은 전 세계적으로 마련된 자금 때문에 가능했습니다. 또한 팬데믹 대응 방법에 대한 연구도 COVID-19가 발생하기 훨씬 전부터 시작되었습니다.

2002년 사스(SARS), 2012년 메르스(MERS) 등과 같은 이전의 코로나바이러스에서 수집된 데이터를 바탕으로 연구자들은 COVID-19 백신 개발에 박차를 가할 수 있었습니다.

호주 식품의약청(TGA)은 COVID-19 백신의 품질과 안전성 및 효능을 엄밀히 평가해 왔습니다. 계속해서 향후 모든 백신에 대해서도 이러한 절차를 거친 후에 호주 국내 승인과 접종이 이루어질 것입니다.

승인이 완료되면, 각 배치의 백신에 대해서도 동일한 품질 기준을 충족하는지 확인되어야 합니다.



백신의 안전성은 지속적으로 모니터링됩니다

COVID-19 백신이 호주와 전 세계적으로 사용됨에 따라 식품의약청은 백신의 안전성을 지속적으로 모니터링할 것입니다.

의료 전문가들은 아무리 사소하더라도 부작용이 발생하는 경우 이를 식약청에 보고함으로써 지속적인 모니터링을 지원하고 있습니다.

식약청은 전국 단위로 백신의 안전성을 감독하고, 만일에 안전성 위험이 발생하는 경우 최대한 신속하게 의료기관과 지역사회 및 정부에 알립니다.

COVID-19 백신의 안전성에 대한 자세한 정보는 호주 보건부 웹사이트에 나와 있습니다:

www.health.gov.au/node/18294



COVID-19 백신 접종과 관련해 궁금한 점이 있으면 담당 의사에게 문의하십시오.

자신의 건강 및 COVID-19 백신 접종과 관련해 궁금한 점이 있다면 담당 의사/일반의(GP)와 상담하는 것이 가장 좋습니다.

백신에 대한 알러지 반응을 경험한 적이 있다면 COVID-19 백신을 접종하기 전에 담당 의사와 상담하는 것이 중요합니다.

혈전 증상 뇌정맥혈전증 또는 헤파린 유도 저혈소판증 병력이 있다면 COVID-19 백신을 접종하기 전에 의사와 상담하시기 바랍니다. 이 두 가지 희귀 질환의 병력이 있는 사람은 현재 예방 조치로서 COVID-19 백신을 접종하기 전에 기다릴 것을 권고하고 있습니다.

이 권고 사항은 추가 증거 자료가 수집됨에 따라 변경될 수 있습니다.





COVID-19 백신 부작용

다른 여는 백신들처럼 COVID-19 백신도 부작용이 따릅니다. 부작용 증상들은 대부분 경미하며 일반적으로 하루 이틀 이내에 사라집니다. 백신과 관련해 궁금한 점이 있으면 의사나 간호사 또는 약사에게 문의하십시오.

백신 접종에 따르는 일반적인 반응:

- 주사 부위의 통증
- 근육통 • 두통
- 피로 • 발열

알러지 반응이나 아나필락시스와 같은 심각한 부작용은 매우 드뭅니다. 이러한 부작용이 발생하는 경우를 대비해 백신 접종 기관들은 효과적으로 즉각 대응할 수 있는 약제를 보유하고 있습니다.

COVID-19 아스트라제네카 백신은 혈소판 감소성 혈전증 (TTS)으로 불리는 희귀 부작용과 관련이 있는 것으로 보입니다. 이는 혈액 응고(혈전증)와 혈소판 수치 저하(혈소판 감소증)를 수반하며, 백신 접종 후 4~20일 정도에 발생합니다. 자세한 사항은 의사/일반의(GP)에게 문의하십시오.

자세한 정보

웹사이트:

- 호주 연방정부 보건부 COVID-19 백신 정보:
www.health.gov.au/node/18294
- 빅토리아 주정부 COVID-19 백신 정보:
www.coronavirus.vic.gov.au/korean

전화 연락처:

- 전국 코로나바이러스 상담전화: 코로나 바이러스 질환(COVID-19)에 관한 안내는 호주 정부의 전국 코로나바이러스 상담전화(National Coronavirus Helpline) **1800 020 080**번으로 문의하십시오.
- 24시간 건강 상담 전화 **1800 022 222**.
- 빅토리아 코로나바이러스(COVID-19) 핫라인 **1800 675 398** (24시간).
- **통역이 필요한 경우**, 코로나바이러스(COVID-19) 핫라인 **1800 675 398**번으로 전화한 후 0번을 누르십시오.
- 추가 문의사항이 있는 경우 담당 의사와 상담하시기 바랍니다.

출처:

www.coronavirus.vic.gov.au/getting-vaccinated
www.health.gov.au
www.healthdirect.gov.au/covid-19-vaccine-side-effect-checker

모나쉬 시민 센터(Monash Civic Centre)

📍 293 Springvale Road, Glen Waverley ☎ 9518 3555 🌐 www.monash.vic.gov.au

Language Assist:

普通话	9321 5485	Ελληνικά	9321 5482	廣東話	9321 5481	සිංහල	7005 3002	Italiano	9321 5483
हिंदी	7005 3000	Việt Ngữ	9321 5487	தமிழ்	7005 3003	한국어	9321 5484	Bahasa Indonesia	7005 3001



CITY OF
MONASH

